











Sequenza di vestizione per l'assistenza di pazienti sospetti/infetti da COVID 19. (Rev. 1 - 17.12.2020)


(World Health Organization 2019; CDC 2019; ECDC 2020; prot. n.6872, 09.03.2020 corretto utilizzo DPI COVID 19 Rapporto ISS COVID 19 n. 2/2020 Rev., 28.02.2020; prot. n. 21279, 28.07.2020 - prot. n. 22110, 5.08.2020" indicazioni operative "Guanti monouso per uso sanitario")

Le modalità corrette di vestizione **proteggono l'assistito** da eventuale trasmissione di microrganismi da operatore a paziente.

- I tempi di vestizione sono di circa 2 minuti

! NEI REPARTI con camere prive della **zona filtro**, la **vestizione** avviene all'esterno della camera.

<p>1. Rimuovere anelli, monili/ oggetti personali.</p> 	<p>2. Igiene delle mani: frizione alcolica/acqua e sapone</p> 	<p>3. Controllare l'integrità dei DPI</p> <ul style="list-style-type: none"> - copricapo - Filtrante facciale (FFP2-FFP3) in base all'attività svolta - occhiali per "protezione da goccioline" o schermo facciale - calzari - sovracamice impermeabile idrorepellente TNT monouso a manica lunga con polsino - 1 paio di guanti monouso puliti in nitrile. 
<p>4. Indossare copricapo</p> 	<p>5. Indossare FFP2/FFP3 secondo le indicazioni del caso.</p> <p>! effettuare la prova di tenuta.</p> 	<p>6. Indossare occhiali di protezione/visiera</p> 
<p>7. Indossare calzari</p> 	<p>8. Igiene delle mani: frizione alcolica</p> 	<p>Indossare il sovracamice.</p>  <p>Indossare 1 paio di guanti facendo attenzione che ricoprano i polsini del sovracamice.</p> 



















Sequenza 1 di svestizione per l'assistenza ai pazienti sospetti/infetti da COVID 19 (camice con chiusura posteriore a velcro) (Rev. 1 - 10.12.2020)

(World Health Organization 2019; CDC 2019; ECDC 2020; prot. n.6872, 09.03.2020 corretto utilizzo DPI COVID 19 Rapporto ISS COVID 19 n. 2/2020 Rev., 28.02.2020; prot. n. 21279, 28.07.2020 - prot. n. 22110, 5.08.2020" indicazioni operative "Guanti monouso per uso sanitario")

Le modalità corrette di svestizione **proteggono l'operatore, altri e l'ambiente** da possibili contaminazioni.

➤ I tempi di svestizione sono di circa 3 minuti










<p>1. Con le mani guantate slacciare il laccio all'altezza della vita</p> 	<p>2. Prendere il camice dalla parte anteriore tirare in avanti per staccare la chiusura a velcro posteriore alla base del collo e rimuovere il camice arrotolando lontano dal corpo, con all'interno la parte esterna contaminata. Durante la manovra sono rimossi anche i guanti posti al di sopra del polsino.</p> <p>In caso rimuovere successivamente i guanti.</p> 	<p>3. ! In caso di mano ancora guantata, rimuovere i calzari</p> <p>4. Igiene delle mani</p>  <p>Indossa un paio di guanti</p>   <p>rimuovere i calzari</p> <p>Riporre tutti i DPI rimossi nel contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo. Eseguire l'igiene delle mani.</p>
<p>In assenza di zona filtro, le manovre di seguito descritte si eseguono appena fuori dalla stanza di degenza</p>		
<p>5. Indossare 1 nuovo paio di guanti puliti in vinile.</p> 	<p>5. Rimuovere gli occhiali/schermo facciale facendo attenzione a non toccare la parte anteriore.</p>  	<p>6. Rimuovere il FFP2/FFP3 afferrare gli elastici e rimuovere senza toccare la parte anteriore.</p>  
<p>7. Rimuovere il copricapo verso l'alto e posteriormente.</p> 	<p>8. Rimuovere i guanti.</p>   <p>- Riporre tutti i DPI monouso nel contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo. - I DPI pluriuso (occhiali e visiera) riporli in contenitore per poi procedere alla <u>detersione</u> con soluzione enzimatica 0,15% e <u>disinfezione</u> con sol.ne a base di cloro al 5%(GIOCLOR) o INCIDIN OXY FOAM.</p>	<p>9. Igiene delle mani: frizione alcolica/acqua e sapone.</p>  <p>20 secondi</p>  <p>40-60 secondi</p>




Sequenza 2 di svestizione per l'assistenza ai pazienti sospetti/infetti da COVID 19 (camice con lacci posteriori) (Rev. 1 - 10.12.2020)

(World Health Organization 2019; CDC 2019; ECDC 2020; prot. n.6872, 09.03.2020 corretto utilizzo DPI COVID 19 Rapporto ISS COVID 19 n. 2/2020 Rev., 28.02.2020; prot. n. 21279, 28.07.2020 - prot. n. 22110, 5.08.2020" indicazioni operative "Guanti monouso per uso sanitario")

- Le modalità corrette di svestizione **proteggono l'operatore, altri e l'ambiente** da possibili contaminazioni.
- I tempi di svestizione sono di circa 3 minuti.

<p>1. Con le mani guantate slacciare il laccio all'altezza della vita</p>  <p>- Rimuovere i guanti - igiene delle - indossare un altro paio di guanti in nitrile puliti.</p>	<p>2. Slacciare il laccio all'altezza della nuca e rimuovere il camice sfilandolo lentamente da ciascuna spalla verso la stessa mano, arrotolando lontano dal corpo, con all'interno la parte esterna contaminata. Durante la manovra sono rimossi anche il paio di guanti posti al di sopra del polsino.</p> <p>In caso rimuovere successivamente i guanti</p> 	<p>3. ! In caso di mano ancora guantata, rimuovere i calzari</p> <p>4. Igiene delle mani</p>  <p>Indossa un paio di guanti</p>  <p>rimuovere i calzari</p> <p>Riporre tutti i DPI rimossi nel contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo. Eseguire l'igiene delle mani.</p>
<p>In assenza di zona filtro, le manovre di seguito descritte si eseguono appena fuori dalla camera.</p>		
<p>5. Indossare un nuovo paio di guanti puliti in vinile.</p> 	<p>5. Rimuovere gli occhiali/schermo facciale facendo attenzione a non toccare la parte anteriore.</p>  	<p>6. Rimuovere il FFP2/FFP3 afferrare gli elastici e rimuovere senza toccare la parte anteriore.</p>  
<p>7. Rimuovere il copricapo verso l'alto e posteriormente.</p> 	<p>8. Rimuovere i guanti.</p>  <p>- Riporre tutti i DPI monouso nel contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo. - I DPI pluriuso (occhiali e visiera) riporli in contenitore per poi procedere alla <u>detersione</u> con soluzione enzimatica 0,15% e <u>disinfezione</u> con sol.ne a base di cloro al 5%(GIOCLOR) o INCIDIN OXY FOAM.</p>	<p>9. Igiene delle mani: frizione alcolica/acqua e sapone.</p>  <p>20 secondi</p>  <p>40-60 secondi</p>



Come indossare e rimuovere i guanti puliti


(P-103-AZ, Rev.5 - 26.08.2019)

Come indossare i guanti puliti:

		
<p>PRENDERE UN GUANTO DALLA SCATOLA ORIGINALE PREVIA IGIENE DELLE MANI</p>	<p>TOCCARE SOLO UNA SUPERFICIE LIMITATA DEL GUANTO CORRISPONDENTE AL BORDO SUPERIORE</p>	<p>INFILA IL PRIMO GUANTO</p>
		
<p>PRENDERE IL SECONDO GUANTO CON LA MANO NUDA TOCCANDO SOLO LA SUPERFICIE LIMITATA, CORRISPONDENTE AL BORDO SUPERIORE</p>	<p>PER EVITARE DI TOCCARE LA PELLE DELL'AVAMBRACCIO CON LA MANO GUANTATA, GIRARE LA SUPERFICIE ESTERNA DEL GUANTO CHE DEVE ESSERE INDOSSATO, CON LE DITA PIEGATE DELLA MANO GUANTATA</p>	<p>INDOSSATI I GUANTI, PROCEDERE ALL'ATTIVITÀ CHE NE HA MOTIVATO L'UTILIZZO, EVITANDO OGNI POSSIBILE FONTE DI CONTAMINAZIONE</p>

Come rimuovere i guanti puliti:

		
<p>PRENDERE UN GUANTO A LIVELLO DEL POLSO, PER RIMUOVERLO, SENZA TOCCARE LA PELLE DELL'AVAMBRACCIO STACCANDOLO DALLA MANO.</p>	<p>TENERE IL GUANTO TOLTO NELLA MANO GUANTATA, FAR SCORRERE LE DITA DELLA MANO ALL'INTERNO GUANTO E IL POLSO. RIMUOVERE IL SECONDO GUANTO FACENDOLO ROTOLARE DALLA MANO E PIEGARE NEL PRIMO GUANTO</p>	<p>ELIMINARE I GUANTI RIMOSSI</p>
		
		<p>ED EFFETTUARE L'IGIENE DELLE MANI</p>



Come indossare i FFP2/P3 con elastici dietro alle orecchie



Come indossare i FFP2/P3 con elastici nucaali



1. Tenere il filtrante in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sul dorso della mano.

2. Posizionare il filtrante sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l'alto.

3. Posizionare l'elastico superiore in posizione alta sul capo e quello inferiore in zona nucale sotto le orecchie

4. Posizionare le dita di entrambe le mani sullo stringinaso per adattarlo al naso.

5. Prova di tenuta.
- **Coprire il filtrante** con entrambe le mani, evitando di comprimerlo e di muoverlo dalla posizione.
- **Inspirare profondamente** se si avverte l'ingresso dell'aria dai bordi, riposizionare e rifare la prova.
! per garantire l'efficacia del filtrante, il volto deve essere privo di barba o basette lunghe.

Come rimuovere i FFP2/P3 con elastici nucaali




1.
- Non toccare in nessun caso la superficie anteriore del facciale.
- Inclinare leggermente la testa in avanti, **agganciare** con le dita prima l'elastico inferiore e poi l'elastico superiore e **sfilare** da sopra la testa trattenendo il dispositivo con il mento per evitare l'effetto "fionda".



2.
- Allungare le braccia in avanti facendo quindi cadere il dispositivo in avanti.

- Smaltire nel contenitore dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara



**Università
degli Studi
di Ferrara**

Gruppo di redazione:


Dott.ssa Paola Antonioli
R.I. dott.ssa M.C. Manzalini
S.S.D. Igiene Ospedaliera e Qualità dei Servizi Ambientali, Direzione Medica e
Gestione del Rischio

Ing. M. Nardini;
Tecnico della Prevenzione dott. C. Zerbini
Dipartimento Interaziendale Strutturale di Prevenzione e Protezione

Dott.ssa P. De Paris
Medicina del lavoro Ospedaliera








Dott.ssa E. Tarroni
Dirigente FF. Direttore Direzione delle Professioni


Dott.ssa A. Marra
Direttore U.O. Farmacia Ospedaliera



Sequenza di vestizione con TUTA (III cat.) per l'assistenza di pazienti sospetti/infetti da COVID 19.



(World Health Organization 2019; CDC 2019; ECDC 2020; prot. n. 22110, 5.08.2020 Indicazioni operative "Guanti monouso per uso sanitario") (Rev. 1 - 17.12.2020)

<p>1. Rimuovere anelli, monili/ oggetti personali.</p>   	<p>2. Igiene delle mani: frizione alcolica/acqua e sapone</p>  	<p>3. Controllare l'integrità dei DPI</p> <ul style="list-style-type: none"> - copricapo - Filtrante facciale (FFP2-FFP3) in base all'attività svolta - occhiali per "protezione da goccioline" o schermo facciale - calzari - tuta protettiva idrorepellente tyvek monouso a manica lunga con polsino - 1 paio di guanti monouso puliti in nitrile 
<p>4. Indossare copricapo</p> 	<p>5. Indossare FFP2/FFP3 secondo le indicazioni del caso ed effettuare la prova di tenuta.</p> 	<p>6. Indossare calzari</p> 
<p>8. Igiene delle mani: frizione alcolica</p> 	<p>9. Indossare la TUTA</p> 	<p>10. Indossare schermo facciale</p>  <p>Indossare 1 paio di guanti di nitrile facendo attenzione che ricoprano i polsini della tuta.</p> 




Svestizione:

! QUALSIASI CONTATTO CON I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTAMINATI E IL VISO, LE MUCOSE, LA CUTE. (Rev. 1 - 17.12.2020)

<p>1. Rimuovere i guanti</p>  <p>Igiene delle mani e indossare nuovo paio guanti in nitrile.</p>	<p>2. Rimuovere occhiali di protezione/schermo facciale facendo attenzione a non toccare la parte anteriore e riporlo in un contenitore monouso</p>  	<p>3. Rimuovere la tuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aprire la cerniera - Abbassare il cappuccio verso la parte posteriore - Sfilare le maniche da dietro - Abbassare la tuta toccando la parte esterna - Arrotolare con con all'interno la parte esterna contaminata - Sedersi e sfilare i piedi  
<p>4. Rimuovere i calzari</p> 	<p>5. rimuovere i guanti e praticare l'igiene delle mani con soluzione alcolica per 20 secondi</p>   <p>6. Indossare un nuovo paio di guanti in vinile</p>	<p>7. Rimuovere il filtrante facciale FFP2/FFP3: afferrare gli elastici posteriormente e rimuovere senza toccare la parte anteriore.</p>  
<p>8. Rimuovere il copricapo verso l'alto e posteriormente.</p> 	<p>9. Rimuovere i guanti.</p>  <p>- Riporre tutti i DPI monouso nel contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo. - I DPI pluriuso (occhiali e visiera) riporli in contenitore per poi procedere alla <u>detersione</u> con soluzione enzimatica 0,15% e <u>disinfezione</u> con sol.ne a base di cloro al 5%(GIOCLOR) o INCIDIN OXY FOAM.</p>	<p>10. Igiene delle mani: frizione alcolica/acqua e sapone.</p>  <p>20 secondi</p>  <p>40-60 secondi</p>

NB. Nell'area di svestizione, verrà posizionato un telo monouso/ **pedana uso singolo** spruzzato di disinfettante (soluzione a base di cloro al 5%) che raccoglierà il materiale monouso indossato, poi verrà avvolto su se stesso ed eliminato nei rifiuti pericolosi a rischio infettivo. L'utilizzo di pedana prevede il conferimento nel sacco "biancheria a rischio infettivo".



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara



Università
degli Studi
di Ferrara

Gruppo di redazione:

Dott.ssa Paola Antonioli

R.I. dott.ssa M.C. Manzalini

S.S.D. Igiene Ospedaliera e Qualità dei Servizi Ambientali, Direzione Medica e Gestione del Rischio

Ing. M. Nardini;

Tecnico della Prevenzione dott. C. Zerbini

Dipartimento Interaziendale Strutturale di Prevenzione e Protezione

Dott.ssa P. De Paris

Medicina del lavoro Ospedaliera

Dott.ssa E. Tarroni

Dirigente FF. Direttore Direzione delle Professioni

Dott.ssa A. Marra

Direttore U.O. Farmacia Ospedaliera