

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
ARCISPEDALE S.ANNA
Polo Ospedaliero di Cona
U.O. UROLOGIA

Direttore F.F.: Dott. Carmelo Ippolito

Segreteria Tel. n. **0532/236278 (dal lunedì' al venerdì' ore 9-10)**
Day Surgery I tel. 236262 – Fax 0532/236547 – e-mail: urologia@ospfe.it

Il sottoscrittodichiara di sottoporsi di sua spontanea volontà alla procedura diagnostica di biopsia prostatica multipla ecoguidata per via transrettale con un numero di prelievi variabile, a seconda di quanto si renderà opportuno nel corso dell'esame stesso a parere del Sanitario esecutore dell'esame. La profilassi antibiotica e la preparazione all'esame del tipo scelto dai Sanitaria di codesta U.O. di Urologia.

Il sottoscritto dichiara di non essere allergico ad antibiotici, di non assumere terapia farmacologica con anticoagulanti o antiaggreganti o di averla sospesa prima della data di esecuzione dell'esame.

Il sottoscritto dichiara inoltre di esser stato informato che le procedure di biopsia possono provocare dolore di lieve-media-elevata entità sia al momento dell'introduzione della sonda ecografica, che durante la fase di biopsia. La procedura può esser sospesa in ogni momento a richiesta del paziente. L'anestesia è opzionale ed il paziente può scegliere se eseguire anestesia locale con anestetici, oppure no previa programmazione con l'urologo di riferimento.

Indicazioni all'esecuzione della procedura:

1. Diagnosi di carcinoma prostatico per alterazione di una o più delle seguenti indagini cliniche: PSA al di sopra della norma o esplorazione rettale positiva o anomalie riscontrate all'ecografia transrettale;
2. Precedente riscontro di P.I.N. o A.S.A.P.
3. Stadiazione in soggetti affetti da carcinoma prostatico dopo terapia radiante, crioterapia o chirurgica, per sospetto di ripresa di malattia, oppure per valutazione dell'estensione della neoplasia

N.B.: Come tutte le procedure diagnostiche, anche la biopsia prostatica è gravata da falsi negativi; cioè la possibilità di non ottenere una diagnosi istologica di tumore anche in presenza dello stesso. Ciò può avvenire per diversi fattori: microfocolai, difficoltà tecniche ad eseguire il prelievo, diagnosi anatomo-patologica incerta.

Complicanze frequenti:

Perdite di sangue nelle urine o nel liquido seminale anche per alcuni giorni o più dopo l'esecuzione dell'esame, in genere autolimitante – perdita di sangue dalle vene emorroidarie – disturbi minzionali di tipo irritativi ed ostruttivo – dolore durante l'esecuzione dell'esame – intolleranza o reazioni allergiche agli antibiotici utilizzati

Complicanze rare:

Emorragia rettale o dell'uretra durante o dopo la procedura – febbre – infezioni – ritenzione acuta d'urina – reazione vagale –ematomi.

Dichiaro di esser stato documentato in maniera dettagliata su quanto riportato nel Consenso informato e di aver ricevuto lo schema illustrativo dei consigli da seguire dopo questa procedura diagnostica e le indicazioni con i numeri di telefono a cui rivolgersi in caso di forte dolore, eccessivo sanguinamento, febbre e difficoltà ad urinare

Acconsento **SI / NO** a sottopormi alla procedura diagnostica di biopsia prostratica multipla per via transrettale.

Il Paziente

Il Medico

Ferrara,